Información para el paciente

Lagrima Dorf®

Hidroxipropilmetilcelulosa 0,3 %

Solución oftálmica estéril

Vía de administración: Tópica – Oftálmica

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Contenido del prospecto:

1. ¿Qué contiene LAGRIMA DORF®?
2. ¿Qué es LAGRIMA DORF®?
3. ¿Para qué se utiliza LAGRIMA DORF®?
4. ¿Qué personas no pueden utilizar LAGRIMA DORF®?
5. ¿Qué cuidados debo tener antes de usar LAGRIMA DORF®?
6. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando LAGRIMA DORF®?
7. ¿Cómo usar LAGRIMA DORF®?
8. Posibles efectos adversos
9. Conservación de LAGRIMA DORF®
10. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si utilicé más cantidad de la necesaria?
11. Información adicional

1. **¿Qué contiene LAGRIMA DORF®?**
   Cada 100 mililitros contiene:
   Hidroxipropilmetilcelulosa, Fosfato monosódico, Fosfato disódico, Cloruro de sodio, Cloruro de benzalconio, EDTA disódico, Agua purificada.

2. **¿Qué es LAGRIMA DORF®?**
   LAGRIMA DORF® es una solución oftálmica estéril de uso oftálmico tópico. No debe utilizarse si la tapa no se encuentra intacta.

3. **¿Para qué se utiliza LAGRIMA DORF®?**
   LAGRIMA DORF® es un medicamento que pertenece al grupo de las lágrimas artificiales. LAGRIMA DORF® es un colirio de baja viscosidad que imita los componentes de las lágrimas naturales, permite aliviar la irritación y la sequedad ocular provocada por la exposición al viento o al sol.

4. **¿Qué personas no pueden utilizar LAGRIMA DORF®?**
   No lo use:
   - En caso de alergia a alguno de sus componentes.

5. **¿Qué cuidados debo tener antes de usar LAGRIMA DORF®?**
   Tenga especial cuidado:
   - Para uso tópico ocular únicamente.
   - No utilizar ante la ausencia o rotura del precinto de seguridad.

- Este producto, por contener cloruro de benzalconio como excipiente, puede decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar al menos 15 minutos antes de colocarse las lentes.
- Embarazo y lactancia: Evaluar la relación riesgo/beneficio.

6. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando LAGRIMA DORF®?

- Si experimenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento continuo o irritación ocular, o si la condición empeorara o persistiese durante más de 24 horas, suspender la aplicación de la medicación y consultar nuevamente a su médico.
- Este medicamento contiene cloruro de benzalconio que puede causar irritación ocular, especialmente si tienes ojos secos o trastornos en la córnea.
- Para evitar la contaminación el borde del recipiente no tiene que tocar ninguna superficie.
- Tapar el envase después de su uso.
- No usar si la solución cambia de color o si presenta cierta turbidez.
- Es recomendable desechar el contenido un mes después de haber sido abierto el envase.

7. ¿Cómo usar LAGRIMA DORF®?

LAGRIMA DORF® se administra por vía oftálmica tópica de la siguiente manera:
Lavar las manos.
Instilar 1 o 2 gotas en cada ojo (evitar el contacto entre el ojo y la boca del recipiente) y pestañar varias veces.

8. Posibles efectos adversos

Hipersensibilidad en casos muy raros.
Ocasionalmente puede producir irritación ocular, ardor o puntadas, visión borroso temporal, reacciones alérgicas y ojos enrojecidos después de la colocación de los lentes de contacto.

Si se advierte alguna de éstas reacciones consultar al médico.

9. Conservación de LAGRIMA DORF®

Conservar a temperatura ambiente hasta 25° C.
Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

10. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

11. Información adicional

Presentación: envases con 10 ml y con 15 ml.

PharmaDorf S.A.
Av. Castañares 3222, CABA, Argentina.
Tel.: 011 5218-2511
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 52.549.
Dirección Técnica: Carla Tizzoni, Farmacéutica.

¿Tiene usted alguna pregunta?

www.pharmadorf.com.ar

Reporte cualquier evento adverso al correo: farmacovigilancia@pharmadorf.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: https://vigifloweforms.who-umc.org/ar/medicamentos

Aprobado por Disposición DI-2026-5407-APN-ANMAT#MS mediante el IF-2026-74613510-APN-DERM#ANMAT.

PROSPECTO

Lagrima Dorf
Hidroxipropilmetilcelulosa

Solución oftálmica estéril

Industria Argentina
Venta bajo receta
Vía de administración: Tópica – Oftálmica

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml de solución oftálmica estéril contiene:

Hidroxipropilmetilcelulosa 0,3 g

Excipientes: Fosfato disódico, Fosfato monosódico, Cloruro de sodio, Edta disódico, Cloruro de benzalconio, Agua purificada c.s.p.

ACCION TERAPEUTICA:

Lagrimas artificiales. Código ATC: S01XA20.

INDICACIONES

La sequedad ocular es un trastorno que se presenta frecuentemente en adultos mayores y en aquellas personas que realizan actividades al aire libre, expuestas al sol, viento, o la contaminación ambiental.

Lagrima Dorf está indicado para el alivio temporario del ardor e irritación provocados por la sequedad ocular, o del malestar ocasionado por irritaciones leves del ojo, o la exposición al viento o al sol.

Este producto puede ser usado como protector ocular contra posibles irritaciones. Alivia la irritación, el ardor y la sensación de cuerpo extraño en los ojos, cuando son causados por la sequedad ocular, humedeciendo, lubricando y protegiendo. Debido a su fórmula ayuda a reemplazar y estabilizar la película lagrimal, brindando un alivio duradero frente a los síntomas de sequedad ocular.

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

Propiedades:

Lágrima Dorf® es una gota oftálmica lubricante estéril que contiene Hidroxipropilmetilcelulosa 0,3%, con Fosfato disódico, Fosfato monosódico, Cloruro de sodio, Edta disódico y Cloruro de benzalconio agregado como conservador.

Farmacocinética:

Es probable la absorción de cantidades significativas de hidroxipropilmetilcelulosa. Debido al alto peso molecular de este polímero es improbable la penetración a través de la córnea o la acumulación en los tejidos oculares.

Todos los demás componentes son sustancias bien establecidas en preparaciones farmacéuticas oftálmicas.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

Lavar las manos.

Instilar una o dos gotas en cada ojo (evitar el contacto entre el ojo y la boca del recipiente) y pestañar varias veces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si experimenta dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento continuo o irritación ocular, o si la condición empeorara o persistiese durante más de 24 horas, suspender la aplicación de la medicación y consultar nuevamente a su médico.

Este medicamento contiene cloruro de benzalconio que puede causar irritación ocular, especialmente si tienes ojos secos o trastornos en la córnea.

El cloruro de benzalconio puede ser absorbido por las lentes de contacto blandas y producir su decoloración. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar al menos 15 minutos antes de colocarse las lentes.Para evitar la contaminación el borde del recipiente no tiene que tocar ninguna superficie.

Embarazo y lactancia: Evaluar la relación riesgo/beneficio.

Para uso tópico ocular únicamente.
No utilizar ante la ausencia o rotura del precinto de seguridad.
Tapar el envase después de su uso.
Evitar que la punta del gotero toque cualquier superficie, dado que el producto puede contaminarse con bacterias comunes que podrían causar infecciones oculares. El uso de las soluciones contaminadas puede producir un daño serio al ojo y una subsecuente pérdida de la visión.
No usar si la solución cambia de color o si presenta cierta turbidez.
Es recomendable desechar el contenido un mes después de haber sido abierto el envase.

EFECTOS INDESEABLES

Hipersensibilidad en casos muy raros.

Ocasionalmente puede producir irritación ocular, ardor o puntadas, visión borroso temporal, reacciones alérgicas y ojos enrojecidos después de la colocación de los lentes de contacto.

Si se advierte alguna de estas reacciones consultar al médico.

INTERACCIONES

Ninguna conocida a la fecha. En caso de otro tratamiento ocular local se debe observar un intervalo mínimo de cinco minutos entre aplicaciones.

Lágrima Dorf® gotas oftálmicas lubricantes siempre debe ser la última medicación instilada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a uno de los componentes de la fórmula.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Fernandez: (011) 4808-2655 / 4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

PRECAUCIONES PARA LA CONSERVACION

Conservar a temperatura ambiente hasta 25ºC.

PRESENTACION

Solución Oftálmica Estéril: Frascos goteros con 10 ml y con 15 ml

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 52.549

PharmaDorf S.A.

Av. Castañares 3222, CABA, Argentina. Tel.: 011 5218-2511

www.pharmadorf.com.ar

Dirección Técnica: Carla Tizzoni, Farmacéutica.

Reporte cualquier evento adverso al correo: farmacovigilancia@pharmadorf.com.ar
Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: https://vigifloweforms.who-umc.org/ar/medicamentos

Prospecto aprobado por la A.N.M.AT. Disposición DI-2026-5407-APN-ANMAT#MS mediante el IF-2026-74613510-APN-DERM#ANMAT.